

Mikor forduljunk a Mentőkhöz és a gyermekorvosi ügyelethez?

A mentőket riassza, és kezdje meg az elsősegélynyújtást! Mentők: 10 4 .

- Ha a gyermek nem vesz levegőt, eszméletlen, pulzusa nem tapintható.
- Egyes légzészavarok esetén: nehézlégzés, fulladás, leszürkülés, elkékülés, ugató köhögési rohammal kísért nehéz, húzó belégzés, hirtelen bekövetkező rekedtség kínzó légszomjjal, hirtelen kialakuló heves mellkasi fájdalom.
- Sérülések, balesetek esetén: láthatóan súlyos sérülés, észlelhető csonttörés, magasból leesés, nagy vérzés, vérvesztés, eszméletvesztéses fejsérülés, égés, forrázás, fagyás, kihűlés, vízbefúlás, mérgezés, idegentest félrenyelése, áramütés, vagy ezek gyanúja, állat súlyos harapása, kígyó marása.
- Idegrendszeri tünetek esetén: eszméletlenség, eszméletzavar, eszméletzavarral járó izomrángatózások, feltűnő aluszékonyosság, szokatlan heves nyugtalanság, merev tarkó, csillapíthatatlan fejfájás, erős kínzó szédülés, hirtelen látászavar, kettős látás, öngyilkossági kísérlet.

Ügyelethez forduljon elsősorban! Az ügyelet helye: Mosonyi M. u. 37. Tel.: 215-013

- Egyes lázas állapotok esetén: láz 3 hónaposnál fiatalabb csecsemőnél, szabályos lázcsillapítás ellenére sem enyhülő magas láz, láz súlyos, elesett állapottal.
- Egyes légúti tünetek esetén: kínzó, nem csillapodó köhögés, nehezített ugató köhögés, sípoló nehézlégzés, légúti betegségben hirtelen rosszabbodás, fájdalomcsillapítás ellenére is fennálló kínzó fülfájás.
- Hasi tünetek esetén: csillapíthatatlan görcsös hasfájás, kínzó haspuffadás, szelek elakadása, súlyos, ismétlődő hányás, hasmenés (kiszáradásra utal, ha több órája száraz a pelenka), csecsemőnél véres széklet, erős alhasi fájdalom, erős nőgyógyászati vérzés, a here fájdalmas duzzanata esetén.
- Vizeletürítési zavarok esetén: vizeletürítés több mint 12 óras hiánya, gyakori fájdalmas vizelés lázzal, véres vizelet nagy hasi fájdalommal.
- Veszélyes allergiás állapot esetén: hirtelen bekövetkező, rekedtséggel járó nehezített belégzés, rovarcsípés kifejezett fej/nyak és szemhéj duzzanattal, nagy testfelületre kiterjedő csalánkiütés.
- Egyes bőrtünetek esetén: terjedő bőrvérzések, sárgaság, kiterjedt

bőrkiütések lázzal.

- Szociális sürgősség esetén: ha a gyermeket felügyelet nélkül hagyják, elhanyagolás, bántalmazás jelei vannak.

Indokolatlannak tekinthető az ügyelethez fordulás, ha a gyermeknek:

- enyhe náthája, kevés köhögése, csak hőemelkedése van, vagy láza csillapítható,
- kevés, nem terjedő kiütése van, általános állapota jó, kullancsot kell kivenni,
- hasmenése, nem ismétlődő hányása, székrekedése van jó állapot mellett,
- receptírás; a szokásos tápszere, állandó gyógyszere elfogyott
- igazolás közösségbe, táborozáshoz, sportoláshoz.

Mentő vagy ügyelet hívásakor a következő adatok megadása kötelező:

A BETEG NEVE, hely, születési év, hó, nap

A beteg anyja neve

A beteg lakcíme és esetenként a tartózkodási helye / ha nem a lakcímre hívják az ügyeletet/

A beteg panaszai - azaz miért kérik, hogy az ügyelet vagy a mentő házhoz menjen.

A hozzátartozók kötelesek gondoskodni arról, hogy az ügyeletes orvos és a mentő a beteghez bejuthasson!!

Ehhez szükséges a lakcím pontos megadása, az utca és házsám látható helyen való elhelyezése. Társasházak esetén a lépcsőházba való bejutás biztosítása!! Az ajtó kinyitása!

A kapucsengőn lévő nevek este sötétben olvashatatlanok! A kapucsengők nagyon sok esetben nem működnek, gyakran még a lakáscsengők sem. **AZ ÜGYELETBEN NINCS LEHETŐSÉG RECEPTÍRÁSRA, CSAK A VIZSGÁLATKOR SZÜKSÉGESSÉ VÁLT SÜRGŐS GYÓGYSZER LEGKISEBB CSOMAGOLÁSÁT TUDJÁK BIZTOSÍTANI !!!**

A Karolina Kórház és Rendelőintézet Csecsemő-és Gyermekosztályán készenléti ügyelet van. Amennyiben szüksége van a gyermekorvosi ügyeletre, elsőként a városi, vagy vidéki központi ügyeletet hívja a 215-013-as (városi) és 217-712-es(vidéki) telefonszámokon!

A készenléti ügyelet azt jelenti, hogy a beutalóval érkező beteget először egy belgyógyász szakorvos látja el, majd ha indokoltnak látja, behívja a gyermekgyógyász szakorvost.